

**7 класс.**

**Условия задач.**

**Задача 1. «Плотность».**

В стеклянный стакан кубической формы наливают воду. После взвешивания на весах определили общую массу  $M = 350$  г. Штангенциркулем определили: внутренний диаметр стакана, он оказался равным  $d = 6,9$  см, внешний –  $D = 7,0$  см. Толщина боковых стенок стакана и дна одинакова. Определите плотность стекла, из которого изготовлен стакан. Плотность воды  $1 \text{ г/см}^3$ .

**Задача 2. Встречное движение**

Из пункта  $A$  в пункт  $B$  выехал автомобиль «Волга» со скоростью  $80 \text{ км/ч}$ . В то же время навстречу ему из пункта  $B$  выехал автомобиль «Жигули». В  $12$  часов дня машины проехали мимо друг друга. В  $12:32$  «Волга» прибыла в пункт  $B$ , а ещё через  $18$  минут «Жигули» прибыли в  $A$ . Вычислите скорость «Жигулей».

**Задача 3. «Картошка».**

Оцените длину шкурки, которую снимают, почистив килограмм картошки. Считайте, что картофелины имеют форму шара радиуса  $R = 3$  см. Ширину шкурки примите равной  $1$  см. Во сколько раз изменится длина снятой шкурки, если размер каждой картофелины в  $n$  раз меньше? Килограмм какой картошки можно быстрее почистить: крупной или мелкой?

**Задача 4. Давление.**

Сила давления воды на дно прямоугольного аквариума равна  $60 \text{ Н}$ . На меньшую из боковых стенок, ширина которой  $20 \text{ см}$ , вода давит с силой  $10 \text{ Н}$ . Какова сила давления воды на большую из боковых стенок? Атмосферное давление не учитывайте. Плотность воды  $1000 \text{ кг/м}^3$ , величина  $g \approx 10 \text{ Н/кг}$ .

**Задача 5. Сообщающиеся сосуды**

В одинаковые сообщающиеся сосуды налита жидкость с плотностью  $\rho_m$  так, что ее высота равна  $H$ . В один из сосудов начинают очень медленно подливать другую, более легкую жидкость с плотностью  $\rho_l$ . Что будет происходить в системе? Будут ли иметься какие-то особенности в зависимости высоты заполнения второго сосуда от параметра – количества более легкой жидкости? Жидкости не перемешиваются.

### Решение 1.

Из условия задачи (стакан кубической формулы), внутренний объем равен  $V = d^3$ . Тогда масса налитой воды равна  $m = \rho \cdot d^3$ . Масса же стакана (без воды) равна  $m_c = M - m = M - \rho d^3$ . Искомая плотность  $\rho_c = \frac{M - \rho d^3}{V_c}$ .

Объем стенок стакана определим так: от объема куба со стороной  $D$  вычтем внутренний куб со стороной  $d$ .  $V_c = D^3 - d^3$ , тогда  $\rho_c = \frac{M - \rho d^3}{D^3 - d^3}$ .

$$\text{Вычислим: } \rho_c = \frac{350 - 1 \cdot 6,9^3}{7,0^3 - 6,9^3} = 1,483 \text{ (г/см}^3\text{)}.$$

### Решение 2.

«Волга» проехала путь от пункта  $A$  до места встречи с «Жигулями» за время  $t_x$ , а «Жигули» этот же участок проехали за  $t_1 = 50$  минуты. В свою очередь, «Жигули» проехали путь от пункта  $B$  до места встречи с «Волгой» за время  $t_x$ , а «Волга» этот же участок проехала за  $t_2 = 32$  минуты. Запишем эти факты в виде уравнений:

$$v_2 t_x = v_1 t_1, \quad v_1 t_x = v_2 t_2,$$

где  $v_1$  – скорость «Жигулей», а  $v_2$  – скорость «Волги». Поделив почленно одно уравнение на другое, получим:  $v_1/v_2 = v_2 t_2/v_1 t_1$ , откуда

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} = 0,8.$$

Тогда  $v_1 = 0,8v_2 = 64$  км/ч.

### Решение 3.

Для начала определим площадь поверхности картофелины

$$S = 4\pi R^2 = 4 \cdot 3,14 \cdot 3^2 = 113,04 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Если ширину шкурки принять равной 1 см, то можно нарезать

$$l_1 = \frac{\sqrt{S}}{1} \cdot \sqrt{S} = 113,04 \text{ (см)}.$$

Оценим, сколько картофелин содержится в 1 кг

$$n = \frac{m}{\rho V_1} = \frac{3}{4} \frac{m}{\rho \pi R^3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1200 \cdot 3,14 \cdot (0,03)^3} \approx 8$$

Длина снятой шкурки

$$l = n l_1 = \frac{300m}{\rho R} = 8,33 \text{ м}.$$

Длина снятой шкурки при уменьшении размеров в  $N$  раз

$$L = \frac{300Nm}{\rho R}.$$

Тогда  $L/l = N$ .

Мелкую картошку неудобно держать в руке, отсюда скорость чистки будет уменьшаться, тратится энергия на взятие картошки (больше движений). Крупную картошку почистить удастся быстрее.

#### Решение 4.

Сила давления воды на дно

$$F_{\text{дно}} = p_{\text{дно}} \cdot S_{\text{дно}} = \rho \cdot g \cdot h \cdot a \cdot b, \quad (1)$$

где  $h$  – высота воды,  $a$  и  $b$  – размеры дна,  $F_{\text{дно}} = 60$  Н,  $a = 0,20$  м – меньшая сторона.

Сила давления воды на меньшую стенку

$$F_{\text{бок1}} = p_{\text{ср}} \cdot S_{\text{бок1}} = \rho \cdot g \cdot \frac{h}{2} \cdot a \cdot h, \quad (2)$$

где  $F_{\text{бок1}} = 10$  Н.

Сила давления воды на большую стенку, которую надо найти, равна

$$F_{\text{бок2}} = p_{\text{ср}} \cdot S_{\text{бок2}} = \rho \cdot g \cdot \frac{h}{2} \cdot b \cdot h = \rho \cdot g \cdot \frac{h^2}{2} \cdot b. \quad (3)$$

Из уравнений (1) и (2) найдем значение  $b$  и  $h$ . Например,

$$\frac{F_{\text{дно}}^2}{F_{\text{бок1}}^2} = \frac{(\rho \cdot g \cdot h \cdot a \cdot b)^2}{\rho \cdot g \cdot \frac{h}{2} \cdot a \cdot h} = 2\rho \cdot g \cdot a \cdot b^2, \quad b = \sqrt{\frac{F_{\text{дно}}^2}{2\rho \cdot g \cdot a \cdot F_{\text{бок1}}}} = \frac{F_{\text{дно}}}{\sqrt{2\rho \cdot g \cdot a \cdot F_{\text{бок1}}}},$$

$$F_{\text{дно}} = \rho \cdot g \cdot h \cdot a \cdot \frac{F_{\text{дно}}}{\sqrt{2\rho \cdot g \cdot a \cdot F_{\text{бок1}}}} = F_{\text{дно}} \cdot h \sqrt{\frac{\rho \cdot g \cdot a}{2F_{\text{бок1}}}}, \quad h = \sqrt{\frac{2F_{\text{бок1}}}{\rho \cdot g \cdot a}},$$

$b = 0,3$  м,  $h = 0,1$  м.

Подставим полученное значение в уравнение (3)

$$F_{\text{бок2}} = \frac{\rho \cdot g}{2} \cdot \frac{2F_{\text{бок1}}}{\rho \cdot g \cdot a} \cdot \frac{F_{\text{дно}}}{\sqrt{2\rho \cdot g \cdot a \cdot F_{\text{бок1}}}} = F_{\text{дно}} \sqrt{\frac{F_{\text{бок1}}}{2\rho \cdot g \cdot a^3}}, \quad F_{\text{бок1}} = 15 \text{ Н.}$$

#### Решение 5.

Пусть высота столба тяжелой жидкости в первом сосуде составляет  $l_1$ , а во втором –  $l_2$ . Очевидно,  $l_1 + l_2 = 2H$ . Условие равенства давлений в соединяющей трубке дает  $\rho_l l + \rho_m l_1 = \rho_m l_2$ , где  $l$  – «количество» подлитой легкой жидкости. Из этих двух соотношений легко находим

$$l_2 = H + \frac{\rho_l l}{2\rho_m}.$$

Однако это соотношение будет выполняться лишь до тех пор, пока легкая жидкость не вытеснит тяжелую во второй сосуд, т.е. до  $l_2 = 2H$ , или

$$l = \frac{2\rho_m}{\rho_l} H.$$

Начиная с этого момента, часть легкой жидкости будет перетекать из первого сосуда во второй и всплывать наверх, поскольку жидкости не перемешиваются. В этом случае

$$\rho_L(l - x) = 2\rho_m H + \rho_L x_2,$$

где  $x$  – количество легкой жидкости, перетекшей во второй сосуд. Тогда легко получаем

$$l_2 = 2H + x = 2H + \frac{\rho_L l - 2\rho_m H}{2\rho_L} = \frac{1}{2}l + H \left( 2 - \frac{\rho_m}{\rho_L} \right).$$

Нетрудно видеть, что в первом случае наклон графика зависимости уровня во втором сосуде от количества подлитой жидкости определяется коэффициентом  $\frac{\rho_L}{\rho_m}$ , а во втором –  $\frac{1}{2}$ . Таким образом, соответствующий гра-

фик имеет в точке  $l = \frac{2\rho_m}{\rho_L} H$  излом.